

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

SUDAFED, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Pseudoefedriinvesinikkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama SUDAFED'i täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on SUDAFED ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne SUDAFED'i kasutamist
3. Kuidas SUDAFED'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. SUDAFED'i säilitamine
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON SUDAFED JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

SUDAFED tablette kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskestade turse vähendamiseks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SUDAFED'I KASUTAMIST

SUDAFED tablette ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

- Allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini või ükskõik millise aine suhtes,
- patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,
- patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,
- patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi
- Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism või kinnisenurga glaukoom.
- alla 12-aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SUDAFED:

Ettevaatlik tuleb olla SUDAFED tablettide manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrge silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage kohe SUDAFED'i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

- hallutsinatsioonid
- rahutus

- unehäired

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib SUDAFED'i kasutada ainult juhul, kui arst nii soovib. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SUDAFED tabletid ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Võtmine koos teiste ravimitega

SUDAFED tablettide samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

SUDAFED tabletid võivad vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt.).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski.

Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate SUDAFED õhukese polümeerikattega tablettide koostisainete suhtes

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS SUDAFED TABLETTE KASUTADA

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett 3...4 korda ööpäevas. Maksimaalne annus on 4 tabletti ööpäevas. Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. 6...12-aastastel lastel tuleb kasutada sobivamat ravimvormi – Sudafed siirupit.

Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te olete SUDAFED tablette kasutanud rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamise korral võivad tekkida vererõhu tõus, südamepekslemine, ärritus, rahutus, värisemine ja krampid.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete tarvitanud.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka SUDAFED põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

SUDAFED tablettide tarvitamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel kujul. Tõsisemaid kõrvaltoimeid pseudoefedriini kasutamisel esineb väga harva.

Väga harv (<1/10 000)

Süda ja veresoonkond

- Tahhükardia/ südameklõppimine
- Muud südame rütmihäired ja hüpertensioon

Kesknärvisüsteem

- Ärrituvus
- Ärevus
- Rahutus
- Erutus
- Unetus
- Hallutsinatsioonid ja paranoilised luulud

Nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve

Ülitundlikkusreaktsioonid – võivad ilmneda koos teiste sümpatomimeetikumidega

Muud nähud

- Iiveldus ja/või oksendamine
- Peavalu
- Kusepeetus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. SUDAFED tablettide säilitamine

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

SUDAFED tablette tuleb säilitada toatemperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada!

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Sudafed sisaldab

- Toimeaine on pseudoefedriinvesinikkloriid. Tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.
- Abiained on:
Tableti sisu: laktoos monohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat
Tableti kate: hüpromelloos, punane raudoksiid (E172), talk, makrogool 400

Kuidas Sudafed välja näeb ja pakendi sisu

SUDAFED tablett on punakaspruun, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud "SUDAFED".

Pakend: karbis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Ltd.

c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
Prantsusmaa

Infoleht on viimati koostõlastatud mais 2012